centrum
infectieziekten
friesland

Jelsumerstraat 6
Postbus 21020
8900 JA Leeuwarden
T: 058 293 94 95
F: 058 293 92 00
www.izore.nl
info@izore.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur

Buiten openingstijden bereikbaar
via de Friese ziekenhuizen

TESTEN
RvA M 192

Aanvraagformulier algemene serologie en virologie

Datum ontvangst:	Izore-nummer (hier geen sticker plakken):

Patiëntgegevens (bij voorkeur ponsplaatje gebruiken)

Patiëntnummer / BSN :
Geb. datum en Geslacht :
Meerling: ☐ ja ☐ nee :
Eigen naam :
Naam echtgeno(o)t(e) :
Voornaam :
Adres :
Postcode, woonplaats :
Verzekeraar :
Verzekeringsnummer :

Aanvragend arts
Instelling
Locatie

Cito-bepalingen worden uitsluitend uitgevoerd na telefonisch overleg.

Aard materiaal:

☐ Stolbloed ☐ EDTA-bloed ☐ Liquor Datum afname: _____

☐ Ander materiaal nl: _____

Klinische gegevens (noodzakelijk voor bepaling te gebruiken techniek en interpretatie van uitslagen):

1e Ziektedag: _____

☐ Koorts, temp: _____ °C

☐ Afweerstoornis, te weten: _____

☐ Lymfeklierzwelling, locatie: _____

☐ Ziekte in omgeving: _____

☐ Leverfunctiestoornissen

☐ Contact met dieren: _____

☐ Luchtweginfectie

Symptomen: _____

☐ Prikaccident
datum: _____
tijd: _____

☐ Bron

☐ Ontvanger

beschermende titer tegen hepatitis B bekend ☐ ja / ☐ nee

Gevraagd onderzoek (zie ook achterzijde; indien niet ingevuld wordt onderzoek op basis van klinische gegevens verricht)

Screening:

☐ Zwangerschap (HBsAg, syfilis, HIV)
Datum à terme: _____

☐ IVF (HBsAG, HCV, HIV)

☐ Titerbepaling na hepatitis B vaccinatie

☐ HIV

☐ Z.o.z. voor blokkenschema virologische en serologische diagnostiek

Hepatitis blok:

☐ Serologie acute virale hepatitis (HAV, HBV, HCV, HEV, EBV, CMV)

☐ Serologie chronisch virale hepatitis (HBV, HCV)

Moleculaire detectie (EDTA bloed):

☐ (DNA/RNA) van het volgende virus:
_____

☐ Kwalitatief

☐ Kwantitatief (virale load)

☐ Genotypering

Gaarne onderzoek naar de volgende verwekkers:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Voor informatie over verzendmateriaal en diagnostiek: zie Vademecum op www.izore.nl

iz02a•11-2016

Blokkenschema virologische en serologische diagnostiek

Virussen kunnen meerdere klinische symptomen geven. Omgekeerd kan een klinisch beeld door meerdere virussen worden veroorzaakt. Om deze reden wordt virusdiagnostiek m.n. virusserologie veelal in blokken uitgevoerd op basis van aard/ lokalisatie ziekteproces.
Onderstaande tabel geeft als (noodgedwongen incomplete) leidraad per ziekteproces de indicaties voor serologie in gepaarde danwel éénmalige sera, respectievelijk. geschikte materialen voor viruskweek/detectie. Serologie op tussen haakjes geplaatste verwekkers vindt plaats op nadere indicatie en dient desgewenst apart te worden aangegeven.
Deze tabel omvat de voor Nederland meest voorkomende virale ziekteverwekkers. In individuele gevallen kan een uitgebreider spectrum van diagnostiek noodzakelijk zijn.

	hepatitis acuut	hepatitis chronisch	febris e.c.i.	respiratoir	(meningo)-encefalitis	myo/pericarditis	gastro-enteritis	exantheem	blaasjes	lymphadenopathie	mononucleosis	trombopenie,anemie,leukopenie	congenitale infectie / TORCH	kerato/conjunctivitis	urogenitaal/SOA	arthritis / arthralgie	facialisparese	materiaal voor virusdetectie	enkel (e) of gepaard (p) serum
influenzavirus				s/d		(s)						(s)						resp. materiaal*	p
parainfluenzavirus				s/d		(s)						(s)						resp. materiaal*	p
adenovirus				s/d		(s)	d					(s)		d				resp. materiaal* feces	p
RSV				s/d		(s)						(s)						resp. materiaal*	p
mazelenvirus								(s)											e
bofvirus						(s)													e
rubellavirus								(s)					s						e
parvovirus								s				s	s			s			e
rotavirus							d											feces	
norovirus							d											feces	
EBV	s		s		s	s		s		s	s	s				s	s		e
CMV	s		s			s				s	s	s	s/d						e
HSV					d				d					d	d		s	blaasjeswat	p
VZV					d				d								s	blaasjeswat	p
enterovirus					d	d		d	d					d				liquor, EDTA bloed keel, feces	
HAV	s																		e
HBV	s	s													s	(s)			e
HCV	s	s																	e
HEV	s																		
Mycoplasma pneumoniae				s/d	s	(s)		s				(s)				(s)		resp. materiaal*	p
Chlamydia spp				s		(s)						(s)			d	(s)		♀ vagina uitstrijk, ♂ urine	p
Q-koorts	(s)		s	s/d														resp. materiaal*	p
Legionella pneumophila				s/d														resp. materiaal*	
syfilis	(s)				s			(s)					s		s				e
lyme (borrelia)					s											s	s		e
Toxoplasma gondii			s							s	s		s			(s)			e
Yersinia																(s)			e
hemolytische streptokokken								s								s			p
Barthonella henselae										s/d								punctaat abces	e

s = serologie
d = detectie van de verwekker m.b.v. directe antigeendetectie, PCR etc.
e = enkelvoudig serum in principe voldoende voor diagnostiek
p = 2 serummonsters, eerste gedurende acute fase en tweede 2 a 3 weken later, zijn noodzakelijk voor relevante serologie.
* resp. materiaal = nasopharynx, nasopharynxspoelsel, bronchusspoelsel of BAL.

iz02b•11-2016